

R2 - 07.10.11

Kapittel 1: Vektorer

Løsningsskisser

I

Gitt punktene $A(0, 1, 0)$, $B(4, 3, 1)$, $C(2, 5, 6)$ og $D(1, 1, 9)$.

- Finn \vec{AB} , \vec{AC} , $|\vec{AB}|$, $|\vec{AC}|$.
- Finn vinkelen $\angle AB, AC$.
- Regn ut $\vec{AB} \times \vec{AC}$.
- Hva er arealet utspent av \vec{AB} og \vec{AC} ?
- Finn volumet av pyramiden $ABCD$.
- Finn ligningen for et plan α gjennom A, B og C .
- Finn en parameterfremstilling for planet α .
- Finn avstanden fra D til planet α .
- Finn avstanden fra C til en linje l gjennom A og B .

Oppgave I er på lavt kompetansenivå, bruk av standard teknikker og innsetting av tall i formler:

a)

$$\vec{AB} = [4, 2, 1], \quad |\vec{AB}| = \sqrt{4^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{21} \approx 4.58$$

$$\vec{AC} = [2, 4, 6], \quad |\vec{AC}| = |2[1, 2, 3]| = 2\sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} = 2\sqrt{14} \approx 7.48$$

b)

$$\phi = \angle AB, AC$$

$$\cos \phi = \frac{\vec{AB} \cdot \vec{AC}}{|\vec{AB}| |\vec{AC}|} = \frac{[4, 2, 1] \cdot [2, 4, 6]}{\sqrt{21} \cdot 2\sqrt{14}} = \frac{22}{\sqrt{7} \cdot \sqrt{3} \cdot 2\sqrt{7} \cdot \sqrt{2}} = \frac{11}{7\sqrt{6}} \approx 0.64153$$

$$\phi \approx 50.1^\circ$$

$$\text{c) } \vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ 4 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 6 \end{vmatrix} = [2 \cdot 6 - 1 \cdot 4, -(4 \cdot 6 - 1 \cdot 2), 4 \cdot 4 - 2 \cdot 2] = [8, -22, 12]$$

d)

$$\text{Areal parallelogram: } A = |\vec{AB} \times \vec{AC}| = |[8, -22, 12]| = |2[4, -11, 6]| = 2\sqrt{4^2 + 11^2 + 6^2} = 2\sqrt{173} \approx 26.3$$

e)

$$\text{Volum pyramide: } V = \frac{1}{6} |(\vec{AB} \times \vec{AC}) \cdot \vec{AD}| = \frac{1}{6} |2[4, -11, 6] \cdot [1, 0, 9]| = \frac{58}{3} \approx 19.3$$

f)

Normalvektor: $\vec{n}_\alpha = [4, -11, 6]$ (Velger halvparten av $\vec{AB} \times \vec{AC}$)Gjennom A og $P = (x, y, z)$:

$$\vec{AP} \cdot \vec{n}_\alpha = 0 \Leftrightarrow [x, y-1, z] \cdot [4, -11, 6] = 0 \Leftrightarrow 4x - 11y + 6z + 11 = 0$$

g)

Kan bruke A, \vec{AB} og \vec{AC} : $\alpha : \left\{ \begin{array}{l} x = 0 + 4s + 2t \\ y = 1 + 2s + 4t \\ z = 0 + 1s + 6t \end{array} \right\}$

Alternativt velge for eksempel $x = s, y = t$ og finne

$$z = -\frac{2}{3}x + \frac{11}{6}y - \frac{11}{6} = -\frac{2}{3}s + \frac{11}{6}t - \frac{11}{6}$$

Da får vi: $\alpha : \left\{ \begin{array}{l} x = s \\ y = t \\ z = -\frac{11}{6} - \frac{2}{3}s + \frac{11}{6}t \end{array} \right\}$

h)

Avstand som projeksjon av \vec{AD} på \vec{n}_α : $a = \left| \frac{\vec{AD} \cdot \vec{n}_\alpha}{|\vec{n}_\alpha|} \right| = \frac{[1, 0, 9] \cdot [4, -11, 6]}{\sqrt{4^2 + 11^2 + 6^2}} = \frac{58}{\sqrt{173}} \approx 4.41$

i)

Avstand som høyde i parallellogram utspent av \vec{AB} og \vec{AC} :

$$d = \frac{A}{AB} = \frac{|\vec{AB} \times \vec{AC}|}{|\vec{AB}|} = \frac{2\sqrt{173}}{\sqrt{21}} \approx 5.74$$

II

En kuleflate har ligningen: $x^2 - 4x + y^2 - 18y + z^2 - 4z + 8 = 0$ a) Hva er sentrum S og radius R i kuleflaten?b) Kuleflaten blir tangert av et plan $\alpha : x - 2y + 2z - 15 = 0$. Finn tangeringspunktet T .c) Finn ligningen for de to planene som har avstanden 15 fra S og er parallelle med α .d) To plan parallelt med α har avstanden 5 fra S . Hva er radius r i sirkelen som er skjæringskurven mellom kuleflaten og disse planene?

Hva er høyden i kulesegmentene som disse planene deler kuleflaten i?

Oppgave II er på middels kompetansenivå. Her må man tenke og resonnerer, men oppgavene er standard rutineoppgaver.

a)

Lager fulle kvadrater: $x^2 - 4x + 2^2 + y^2 - 18y + 9^2 + z^2 - 4z + 2^2 = -8 + 2^2 + 9^2 + 2^2 \Leftrightarrow$

$$\text{Kuleflate: } (x-2)^2 + (y-9)^2 + (z-2)^2 = 9^2$$

): Sentrum $S = (2, 9, 2)$, Radius $R = 9$.

b)

Normalvektor til plan: $\vec{n} = [1, -2, 2]$, $|\vec{n}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = 3$ Går til tangeringspunkt via sentrum S :

$$\vec{OT} = \vec{OS} \pm R \frac{1}{|\vec{n}|} \vec{n} = [2, 9, 2] \pm 9 \cdot \frac{1}{3} [1, -2, 2] = [5, 3, 8]$$

$$T = (5, 3, 8) \quad (T = (-1, 15, -4) \text{ forkastes da det ikke ligger i planet.})$$

c)

Plan parallelle med α har ligningen: $x - 2y + 2z + d = 0$

Vi bruker avstandsformelen og får betingelsen:

$$\left| \frac{x_S - 2y_S + 2z_S + d}{|\vec{n}|} \right| = 15 \Leftrightarrow \left| \frac{2 - 2 \cdot 9 + 2 \cdot 2 + d}{3} \right| = 15 \Leftrightarrow$$

$$|d - 12| = 45 \Leftrightarrow d - 12 = \pm 45 \Leftrightarrow d = 57 \vee d = -33$$

): To plan: $x - 2y + 2z + 57 = 0$ og $x - 2y + 2z - 33 = 0$

d)

Finner de to planene på samme måte som i c):

$$\left| \frac{x_S - 2y_S + 2z_S + d}{|\vec{n}|} \right| = 5 \Leftrightarrow \left| \frac{d - 12}{3} \right| = 5 \Leftrightarrow |d - 12| = 15 \Leftrightarrow d - 12 = \pm 15 \Leftrightarrow d = 27 \vee d = -3$$

Tegn en snittfigur og bruk Pythagoras til å regne ut det vi trenger:

$$\text{Radius i snittsirkel: } r = \pm \sqrt{9^2 - 5^2} = 2\sqrt{14} \approx 7.48$$

$$\text{Høydene: } h_1 = R - 5 = 9 - 5 = 4$$

$$h_2 = R + h_1 = 9 + 5 = 14$$

(De to planene ligger symmetrisk om S , så snittfiguren gir de samme tallene for høydene uansett hvilket av de to planene vi bruker.)

III

- a) Forklar hvilke muligheter vi har for å avgjøre om to linjer er parallelle.
 b) Forklar hvilke muligheter vi har for å avgjøre om fire punkter ligger i samme plan.
 c) Vis at avstanden mellom to plan $ax + by + cz + d_1 = 0$ og $ax + by + cz + d_2$ blir:
- $$a = \frac{|d_1 - d_2|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Oppgave III er på middelse og høyt kompetansenivå. Her må man tenke og resonnerer og oppdage ting man kanskje ikke har tenkt over eller sett før.

a)

1) R1-metode: Sjekk om linjenes retningsvektorer er parallelle med vektorligning:

$$\vec{r}_l \parallel \vec{r}_m \Leftrightarrow \vec{r}_l = k \vec{r}_m$$

2) R2-metode: Sjekk om linjenes retningsvektorer er parallelle vha. vektorprodukt: (Sjekk om utspent areal er null.)

$$\vec{r}_l \parallel \vec{r}_m \Leftrightarrow \vec{r}_l \times \vec{r}_m = \vec{0}$$

3) Sjekk om vinkelen mellom retningsvektorene er 0° eller 180° med skalarproduktformelen:

$$\vec{r}_l \parallel \vec{r}_m \Leftrightarrow \cos \alpha = \pm 1$$

(Sjekk vi om arealet utspent av retningsvektorene er null med arealformelen)

$$|\vec{r}_l \times \vec{r}_m| = \sqrt{|\vec{r}_l|^2 |\vec{r}_m|^2 - (\vec{r}_l \cdot \vec{r}_m)^2}$$

$$\vec{r}_l \parallel \vec{r}_m \Leftrightarrow \sqrt{|\vec{r}_l|^2 |\vec{r}_m|^2 - (\vec{r}_l \cdot \vec{r}_m)^2} = 0 \Leftrightarrow |\vec{r}_l|^2 |\vec{r}_m|^2 - (\vec{r}_l \cdot \vec{r}_m)^2 = 0 \Leftrightarrow$$

$$|\vec{r}_l| |\vec{r}_m| = \pm \vec{r}_l \cdot \vec{r}_m \Leftrightarrow \frac{\vec{r}_l \cdot \vec{r}_m}{|\vec{r}_l| |\vec{r}_m|} = \pm 1 \Leftrightarrow \cos \alpha = \pm 1$$

illustrerer dette sammenhengen mellom 2) og 3).)

b)

1)

Tre av punktene ligger alltid i et plan og definerer en trekant.

Hvis det fjerde punktet ikke ligger i samme plan, vil vi kunne lage en pyramide med toppunkt i det fjerde punktet og med trekanten som grunnflate. Ligger alle i samme plan blir volumet null:

$$A, B, C, D \text{ i samme plan} \Leftrightarrow (\vec{AB} \times \vec{AC}) \cdot \vec{AD} = 0$$

2)

En annen variant er å la \vec{AB} og \vec{AC} definere et koordinatsystem i et plan gjennom A, B og C . Hvis D ligger i samme plan må det finnes en unik løsning av vektorligningen:

$$\vec{AD} = x\vec{AB} + y\vec{AC}$$

c)

Avstandsformelen $a = \frac{|ax_p + by_p + cz_p + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$ degenererer til $a = \frac{|d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$

når punktet ligger i origo.

Hvis to plan ligger på samme side av origo har d_1 og d_2 i de to ligningene for de to planene samme fortegn og vi må finne differansen $|d_1| - |d_2|$.

Ligger de på hver sin side har d_1 og d_2 motsatt fortegn og vi må finne summen $|d_1| + |d_2|$.

Begge tilfeller er ivarettatt i formelen: $a = \frac{|d_1 - d_2|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$.